

Funkce **jedné prom.** $y = f(x)$ definovaná implicitně zadanou rovnicí $F(x, y) = 0$.
(krátce: **implicitní funkce**)

Věta 7.2

Nechť 1. $F(x_0, y_0) = 0$

2. Derivace F_x, F_y jsou spojité v okolí bodu $[x_0, y_0]$.

3. $F_y(x_0, y_0) \neq 0$.

Potom existuje okolí $U(x_0) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$

a jediná fce $y = f(x)$ taková, že

1. $f(x_0) = y_0$ a pro $\forall x \in U(x_0)$ je

$$F(x, f(x)) = 0$$

2. funkce f, f' jsou spojité v okolí $U(x_0)$,

3. pro každé $x \in U(x_0)$ existuje derivace

$$f'(x) = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}, \text{ kde } y = f(x).$$

Dodatek. Má-li fce F v okolí $U(x_0, y_0)$ spojité

PD až do řádu k , pak implicitní funkce

$y = f(x)$ má též spojité derivace do řádu k .

Př. 1.

a) Rovnicí

$$F(x, y) = x^3 + y^4 - \sin y - 8 = 0$$

je v okolí bodu $[x_0, y_0] = [2, 0]$ implicitně určena funkce $y = f(x)$, která má spojitě derivace $f'(x)$, $f''(x)$ (v okolí bodu $x_0 = 2$). Ověřte !

b) Hodnoty derivací $f'(2)$, $f''(2)$.

c) Monotonie funkce f v okolí bodu x_0 .

d) Taylorův polynom $T_2(x)$ funkce f se středem v bodě $x_0 = 2$.

e) Přibližná hodnota funkce f v bodě $x = 1.9$ pomocí $T_2(x)$.

Varianty zadání

c) Rovnice tečny a normály ke grafu funkce f

d) Je funkce f konvexní nebo konkávní v okolí bodu x_0 ?

Tvar grafu funkce f .

e) Extrém funkce f v bodě x_0 ?

f*) Body $[x, y]$, ve kterých nejsou splněny postačující podmínky pro existenci implicitní funkce.

Př. 2. a) Ověřte, že rovnicí

$$F(x, y) = x^2 + 3x^2y - 10y^2 - 6x + 6 = 0$$

je implicitně určena funkce $y = f(x)$, jejíž graf prochází bodem $[x_0, y_0] = [2, 1]$ a která má spojitou 1. a 2. derivaci v okolí bodu $x_0 = 2$.

b) Určete hodnotu derivace $f'(1)$. Napište rovnici tečny ke grafu funkce f v bodě dotyku $[2, 1]$. Pomocí rovnice tečny určete přibližně hodnotu $f(2.2)$.

c) Určete 2. derivaci $f''(2)$. Je funkce f konvexní nebo konkávní v okolí bodu $x_0 = 2$? Načrtněte tečnu a tvar grafu funkce f v okolí bodu $[x_0, y_0]$.

Funkce **dvou prom.** $z = f(x, y)$ implicitně definovaná zadanou rovnicí $F(x, y, z) = 0$ v okolí bodu $A = [x_0, y_0, z_0]$ (krátce: **implicitní funkce**)

Věta 7.5

Nechť 1. $F(A) = 0$

2. Derivace F_x, F_y, F_z jsou spojité v okolí $U(A)$.

3. $F_z(A) \neq 0$.

Potom existuje okolí $U(x_0, y_0)$ a jednoznačně určená fce $z = f(x, y)$ taková, že

1. $f(x_0, y_0) = z_0, F(x, y, f(x, y)) = 0$ v $U(x_0, y_0)$,

2. funkce f a derivace f_x, f_y jsou spojité v $U(x_0, y_0)$,

3. pro každé $[x, y] \in U(x_0, y_0)$ existují parciální

derivace $\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$.

Derivace na levých stranách jsou v bodě $[x, y]$,
na pravých stranách v bodě $[x, y, f(x, y)]$.

Příklad. Ověřte, že rovnicí

$$F(x, y, z) = x + y^2 + z^3 + x^2yz - 4 = 0$$

je v okolí bodu $A = [1, -2, 1]$ implicitně určena funkce $z = f(x, y)$, která má spojitě PD v okolí bodu $[1, -2]$.

Proveďte potřebné výpočty a uveďte vše, co víte o implicitní funkci f v bodě $[1, -2]$: PD, gradient, geometrický význam, tečná rovina, diferenciál, přibl. výpočet hodnoty $f(1.1, -2.1)$, derivace ve směru $\vec{s} = (1, -1)$.

Příklad. Určete tečnou rovinu k ploše

$$z^3 + 3x^2z + 2xy = 0$$

v bodě $A = [1, -2, 1]$.

Výsledek: $x + y + 3z - 2 = 0$